- Durée 2 h
- Calculatrices autorisées

Barème :

1) 4 pts 2) 3 pts 3) 3 pts

4) 3 pts 5) 3 pts 6) 4 pts

nom :

voisin :

voisin :

voisin :

Commentaires : Lisez l'énoncé en entier avant de commencer et répondez bien aux questions qui vous sont demandées. Vous pouvez faire les exercices dans l'ordre que vous souhaitez. La rédaction est importante. Soyez propre et clair. Bonne chance ...

APPLICATION DU PRODUIT SCALAIRE

Ex1 :

- a) Démontrer que l'équation $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 18 = 0$ est celle d'un cercle C. Déterminer les coordonnées de son centre et son rayon.
- b) Démontrer que les points A (3 ; 5) et B (5 ; -1) appartiennent au cercle C.
- c) Déterminer une équation de la tangente en A, puis une équation de la tangente en B au cercle C.
- d) Déterminer les coordonnées de T le point d'intersection de ces deux tangentes.

a) $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 18 = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 - 1 + (y-1)^2 - 1 - 18 = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2 + (y-1)^2 = 20$

Ainsi C est le cercle de centre I (1 ; 1) et de rayon $\sqrt{20} = 2\sqrt{5}$

b)

- $(3-1)^2 + (5-1)^2 = 4 + 16 = 20$ donc $A \in C$
- $(5-1)^2 + (-1-1)^2 = 16 + 4 = 20$ donc $B \in C$

c)

• La tangente d en A au cercle C et la droite passant par A et perpendiculaire à la droite (IA)
On a $\vec{IA} (2 ; 4)$ et $\vec{IA}$ est un vecteur normal à d.

Ainsi d a une équation de la forme : $2x + 4y + c = 0$ (avec $c \in \mathbb{R}$)

De plus d passe par A, donc :

$$2 \times 3 + 4 \times 5 + c = 0 \Leftrightarrow c = -26$$

Ainsi d a pour équation :

$$2x + 4y - 26 = 0 \Leftrightarrow x + 2y - 13 = 0$$

• La tangente d' en B au cercle C et la droite passant par B et perpendiculaire à la droite (IB)

On a $\vec{IB} (4 ; -2)$ et $\vec{IB}$ est un vecteur normal à d'.

Ainsi d' a une équation de la forme : $4x - 2y + c' = 0$ (avec $c' \in \mathbb{R}$)

De plus d' passe par B, donc :

$$4 \times 5 + 2 \times 1 + c' = 0 \Leftrightarrow c' = -22$$

Ainsi d' a pour équation :

$$4x - 2y - 22 = 0 \Leftrightarrow 2x - y - 11 = 0$$

d) Les coordonnées de T vérifient le système ci-dessous :

$$\begin{cases} x + 2y - 13 = 0 \\ 2x - y - 11 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow \begin{cases} x = 7 \\ y = 3 \end{cases}$$

Ex2 :

Soit un triangle ABC (tel que $\widehat{BAC}$ est un angle aigu) inscrit dans un cercle de centre O et de rayon R.

On pose $BC = a$, $AB = c$, $AC = b$ et $\widehat{BAC} = \widehat{A}$.

On note D le point diamétralement opposé au point B.

a) Démontrer que $\frac{a}{\sin A} = 2R$

b) Prouver que l'aire du triangle est : $S = \frac{abc}{4R}$

a) Les angles inscrits $\widehat{BAC}$ et $\widehat{BDC}$ interceptent le même arc de cercle.

On a donc $\widehat{BAC} = \widehat{BDC} = \widehat{A}$

Dans le triangle BCD, C appartient au cercle, donc BCD est rectangle en C.

Ainsi :

$$\sin \widehat{BDC} = \sin \widehat{A} = \frac{BC}{BD} = \frac{a}{2R} \dots$$

b)

On sait que $S = \frac{1}{2} b c \sin \widehat{A}$

$$\text{Donc } S = \frac{1}{2} b c \sin \widehat{A} = \frac{1}{2} b c \frac{a}{2R} = \frac{abc}{4R}$$

Ex3 :

a) Montrer que : $\cos 2x \cos x \sin x = \frac{1}{4} \sin 4x$

En déduire une simplification de l'écriture suivante : $\cos 4x \cos 2x \cos x \sin x$

b) Calculer l'expression : $\cos \frac{\pi}{9} \cos \frac{2\pi}{9} \cos \frac{4\pi}{9}$

a)

$$\bullet \cos 2x \cos x \sin x = \cos 2x \times \left(\frac{1}{2} \sin 2x \right) = \frac{1}{2} \cos 2x \sin 2x = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \sin 4x = \frac{1}{4} \sin 4x$$

$$\bullet \cos 4x \cos 2x \cos x \sin x = \cos 4x \times \frac{1}{4} \sin 4x = \frac{1}{4} \cos 4x \sin 4x = \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times \sin 8x = \frac{1}{8} \sin 8x \quad (1)$$

b)

En utilisant (1) et $\sin \frac{8\pi}{9} = \sin \frac{\pi}{9}$, on obtient : $\cos \frac{\pi}{9} \cos \frac{2\pi}{9} \cos \frac{4\pi}{9} = \frac{1}{8}$

SUITES NUMERIQUES

Ex 4 :

u est une suite définie sur $\mathbb{N}$ et croissante.

v est une suite définie sur $\mathbb{N}$, à termes strictement positifs et croissante.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $w_n = u_n - \frac{1}{2v_n}$

Que peut-on dire de la suite w ?

u est croissante, donc pour tout entier n, on a : $u_n \leq u_{n+1}$

v est croissante, donc pour tout entier n, on a :

$$\begin{aligned} v_n \leq v_{n+1} &\Leftrightarrow 2v_n \leq 2v_{n+1} \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{2v_n} \geq \frac{1}{2v_{n+1}} \quad (\text{car pour tout } n \in \mathbb{N}, v_n > 0) \\ &\Leftrightarrow -\frac{1}{2v_n} \leq -\frac{1}{2v_{n+1}} \end{aligned}$$

On en déduit que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$u_n - \frac{1}{2v_n} \leq u_{n+1} - \frac{1}{2v_{n+1}} \Leftrightarrow w_n \leq w_{n+1}$$

ainsi la suite w est croissante.

Ex 5 :

Calculer les sommes ci-dessous :

a) $S = 5 + \frac{17}{3} + \frac{19}{3} + 7 + \dots + \frac{187}{3} + 63$

Soit la suite (u_n) définie par $u_n = 5 + \frac{2}{3}n$; (u_n) est une suite arithmétique de premier terme $u_0 = 5$ et de raison $\frac{2}{3}$

On a $S = u_0 + u_1 + \dots + u_p$

et $u_p = 63 \Leftrightarrow 5 + \frac{2}{3}p = 63 \Leftrightarrow \frac{2}{3}p = 58 \Leftrightarrow p = 87$

Ainsi $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{87} = 88 \times \frac{u_0 + u_{87}}{2} = 44 \times (5 + 63) = 44 \times 68 = 2992$

b) $S' = \frac{1}{8} + \frac{\sqrt{2}}{8} + \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} + \dots + 16 + 16\sqrt{2}$

Soit la suite (v_n) définie par $v_n = \frac{1}{8} (\sqrt{2})^n$; (v_n) est une suite géométrique de premier terme $v_0 = \frac{1}{8}$ et de raison $\sqrt{2}$

On a $S' = v_0 + v_1 + \dots + v_p$

et $v_p = 16\sqrt{2} \Leftrightarrow \frac{1}{8} (\sqrt{2})^p = 16\sqrt{2} \Leftrightarrow (\sqrt{2})^{p-1} = 128$

On a $(\sqrt{2})^{14} = 128$

Donc $p = 15$

Ainsi $S = v_0 + v_1 + \dots + v_{15} = \frac{1}{8} \times \frac{1 - (\sqrt{2})^{16}}{1 - \sqrt{2}} = \dots = \frac{255}{8} (1 + \sqrt{2})$

Ex 6 :

u est la suite définie par $u_0 = 0$ est la relation de récurrence $u_{n+1} = \frac{2u_n + 3}{u_n + 4}$ pour tout entier n .

v est la suite définie pour tout entier n par $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 3}$.

a) Montrer que v est une suite géométrique dont on précisera le premier terme v_0 et la raison.

b) Exprimer v_n en fonction de n .

c) En déduire u_n en fonction de n .

a)

Pour tout entier n , on a :

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 3} = \frac{\frac{2u_n + 3}{u_n + 4} - 1}{\frac{2u_n + 3}{u_n + 4} + 3} = \frac{u_n - 1}{5u_n + 15}$$

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{\frac{u_n - 1}{5u_n + 15}}{\frac{u_n - 1}{u_n + 3}} = \dots = \frac{1}{5}$$

Ainsi (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{5}$ et de premier terme $v_0 = \frac{u_0 - 1}{u_0 + 3} = -\frac{1}{3}$

b) Pour tout entier n , on a :

$$v_n = -\frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{5}\right)^n$$

c) Pour tout entier n , on a :

$$\begin{aligned} v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 3} &\Leftrightarrow v_n \times u_n + 3 \times v_n = u_n - 1 \\ &\Leftrightarrow v_n \times u_n - u_n = -1 - 3 v_n \\ &\Leftrightarrow u_n \times (v_n - 1) = -1 - 3 v_n \\ &\Leftrightarrow u_n = \frac{-1 - 3 v_n}{v_n - 1} \end{aligned}$$

En remplaçant par $v_n = -\frac{1}{3} \times \left(\frac{1}{5}\right)^n$, on obtient :

$$u_n = -3 \frac{\left(\frac{1}{5}\right)^n - 1}{\left(\frac{1}{5}\right)^n + 3} = -3 \times \frac{1 - 5^n}{1 + 3 \times 5^n} = 3 \times \frac{5^n - 1}{1 + 3 \times 5^n}$$