

## GENERALITES SUR LES FONCTIONS

### 1) QUELQUES RAPPELS ESSENTIELS SUR LA NOTION DE FONCTION

#### A) DEFINITION

Pour schématiser, **une fonction** est un procédé qui associe à chaque réel d'un intervalle donné **un unique** réel.

Mathématiquement parlant, on caractérise une fonction de la façon suivante :

$$f: I \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$x \longmapsto f(x)$$

Cette écriture signifie que la fonction  $f$ , définie sur l'intervalle  $I$ , associe à tout réel  $x$  de l'intervalle  $I$ , **le** ( il est unique ) réel noté  $f(x)$ , appelé **image de  $x$  par  $f$** .

$x$  ne représente pas un réel donné, mais n'importe lequel des éléments de l'intervalle  $I$ . On dit que  $x$  est une variable. ( On peut aussi utiliser les lettres  $u, t, \dots$  )

On a appelé la fonction  $f$ , mais rien ne nous oblige à l'appeler ainsi. ( On utilise souvent les lettres  $g, h, \dots$  ou  $f_1, f_2, \dots$  )

#### **Rem:**

- Dans la pratique, les fonctions sont souvent données sans que soit précisé l'ensemble de définition.

**Dans ce cas n'oubliez pas de chercher Df**, en vous rappelant qu'il s'agit de tous les réels  $x$  tels que  $f(x)$  soit calculable.

- Les fonctions peuvent aussi être définies sur des réunions d'intervalles.

Par exemple la fonction inverse  $f: x \longmapsto \frac{1}{x}$  est définie sur  $\mathbb{R}^*$ .


#### B) REPRESENTATION GRAPHIQUE

Le plan est muni d'un repère orthogonal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

Si possible, on prend le repère orthonormal

Soit  $f$  une fonction définie sur une partie  $I$  de  $\mathbb{R}$  ( $I$  est un intervalle ou une réunion d'intervalles).

L'ensemble des points  $M$  de coordonnées  $(x, f(x))$  où  $x$  décrit  $I$  est **la courbe représentative** ( ou **représentation graphique** ) de la fonction  $f$  dans le plan.



On note, le plus souvent,  $C_f$  la courbe représentative de  $f$ .

On dit que la courbe  $C_f$  a pour équation cartésienne  $y = f(x)$  relativement au repère  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

#### **Rem:**

- On a déjà insisté sur le fait que pour tout réel  $x$  de  $I$ ,  $f(x)$  est unique.

On en déduit une interprétation géométrique : toute droite parallèle à l'axe des ordonnées coupe la courbe représentative d'une fonction en **au plus** un point. Ceci est un moyen simple pour savoir si une courbe représente ou non une fonction ...

- $f(a)$  est l'**unique image** de  $a$ .
- $x_1, x_2$  et  $x_3$  sont **les antécédents** de  $b$ . ( Un réel peut admettre aucun antécédent, ou un, ou plusieurs antécédents. )

### 2) PARITE

Soit  $f$  une fonction définie sur un ensemble **I centré en zéro**.

- On dit que  $f$  est **paire** si, pour tout réel  $x$  de  $I$ ,  $f(-x) = f(x)$ .
- On dit que  $f$  est **impaire** si, pour tout réel  $x$  de  $I$ ,  $f(-x) = -f(x)$ .

ne pas oublier de le vérifier

I centrée en zéro signifie que pour tout élément  $x$  de  $I$ ,  $-x$  est aussi dans  $I$ .

**Rem:**  $\mathbb{R}$  et  $\mathbb{R}^*$  sont bien sûr centrés sur 0. Si une fonction  $f$  est définie sur  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{R}^*$ , il suffit seulement de montrer une des deux relations.

**Ex :**

Les fonctions  $x \mapsto |x|$ ,  $x \mapsto \cos x$  et  $x \mapsto x^2$ , définies sur  $\mathbb{R}$ , sont des fonctions paires .

Les fonctions  $x \mapsto x$ ,  $x \mapsto \sin x$  et  $x \mapsto x^3$ , définies sur  $\mathbb{R}$ , et la fonction  $x \mapsto \frac{1}{x}$ , définie sur  $\mathbb{R}^*$ , sont des fonctions impaires .

Interprétation graphique :


Le plan est muni d'un repère orthogonal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

La courbe représentative d'une fonction paire admet l'axe des ordonnées pour axe de symétrie .

Ex :  $f : x \mapsto x^2 - 1$

La courbe représentative d'une fonction impaire admet le point O pour centre de symétrie .

Ex :  $f : x \mapsto 3x^3$



**Rem :** Si une fonction f est paire ou impaire, il suffit de l'étudier sur  $Df \cap \mathbb{R}_+$  .

**3) VARIATIONS**

**A.) FONCTION CROISSANTE ...**

On ne parle de croissance ou de décroissance que sur un intervalle

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On dit que :

- f est **croissante** ( resp. **strictement croissante** ) sur I, lorsque pour tous réels x et x' de I, tels que  $x < x'$ , on a  $f(x) \leq f(x')$  ( resp.  $f(x) < f(x')$  ) .
- f est **décroissante** ( resp. **strictement décroissante** ) sur I, lorsque pour tous réels x et x' de I, tels que  $x < x'$ , on a  $f(x) \geq f(x')$  ( resp.  $f(x) > f(x')$  ) .
- f est **monotone** ( resp. **strictement monotone** ) sur I, lorsque f est soit croissante ( resp. strictement ) sur I, soit décroissante ( resp. strictement ) sur I .

Etudier les variations d'une fonction, c'est préciser les intervalles sur lesquels la fonction est monotone.

On résume ces résultats dans un tableau appelé ( comme vous le savez ) **tableau de variations** .

**B.) EXTREMUM**

Soit f une fonction définie sur un intervalle I,  $x_m$  et  $x_M$  deux réels de I . On dit que :

- f admet **un minimum** sur I en  $x_m$ , si pour tout réel x de I,  $f(x_m) \leq f(x)$  .
- f admet **un maximum** sur I en  $x_M$ , si pour tout réel x de I,  $f(x_M) \geq f(x)$  .

**Ex :** Pour tout réel x,  $x^2 + 1 \geq 1$  . De plus  $0^2 + 1 = 1$   
Ainsi, la fonction  $x \mapsto x^2 + 1$  admet 1 comme maximum en 0

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On dit que :

- f est **majorée** sur I, s'il existe un réel M tel que pour tout x de I,  $f(x) \leq M$  .  
On dit que M est **un majorant** de f .
- f est **minorée** sur I, s'il existe un réel m tel que pour tout x de I,  $f(x) \geq m$  .  
On dit que m est **un minorant** de f .
- f est **bornée** sur I, si elle est minorée et majorée sur I .

Tout réel M' supérieur à M est aussi un majorant de f .

Tout réel m' inférieur à m est aussi un minorant de f .


Une fonction est majorée par son maximum et est minorée par son minimum .

**Attention :**

Une fonction peut admettre un majorant ( ou un minorant ) sur un intervalle sans admettre forcément de maximum( ou de minimum ) .

**Ex :** La fonction inverse est minorée par 0 sur l'intervalle  $]0; +\infty[$ , mais 0 n'est pas un minimum ...

Interprétation graphique :











Dire que, sur un intervalle I, f est minorée par m et f est majorée par M ( c'est à dire f est bornée ) revient à dire graphiquement que la courbe représentative de f restreinte à I est située entre les deux droites parallèles d'équation  $y = m$  et  $y = M$

**Remarque importante :** La notion de dérivée que nous verrons plus tard est un outil très performant pour l'étude des variations ; nous ne nous attarderons donc pas sur les méthodes que vous avez vues en classe de seconde.

#### 4) PANORAMA DES FONCTIONS DE REFERENCE

Fonctions	Ensemble de définition, variations ...
$f : x \mapsto ax + b$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Df = <math>\mathbb{R}</math></li> <li>Si <math>a &gt; 0</math> f est strictement croissante sur <math>\mathbb{R}</math></li> <li>Si <math>a &lt; 0</math> f est strictement décroissante sur <math>\mathbb{R}</math></li> </ul>
$f : x \mapsto x^2$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Df = <math>\mathbb{R}</math></li> <li>f est paire</li> <li>f est strictement décroissante sur <math>] -\infty ; 0 ]</math> et strictement croissante sur <math>[ 0 ; +\infty [</math></li> <li>La courbe représentative de f est <b>une parabole</b> de sommet O.</li> </ul>
$f : x \mapsto x^3$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Df = <math>\mathbb{R}</math></li> <li>f est impaire</li> <li>f est strictement croissante sur <math>\mathbb{R}</math></li> </ul>
$f : x \mapsto \frac{1}{x}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Df = <math>\mathbb{R}^*</math></li> <li>f est impaire</li> <li>f est strictement décroissante sur <math>] -\infty ; 0 [</math> et strictement décroissante sur <math>] 0 ; +\infty [</math></li> <li>La courbe représentative de f est <b>une hyperbole</b> de sommet O.</li> </ul>
$f : x \mapsto \sqrt{x}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Df = <math>[ 0 ; +\infty [</math></li> <li>f est strictement croissante sur <math>[ 0 ; +\infty [</math></li> </ul>
$f : x \mapsto  x $	<ul style="list-style-type: none"> <li>Df = <math>\mathbb{R}</math></li> <li>f est paire</li> <li>f est strictement décroissante sur <math>] -\infty ; 0 ]</math> et strictement croissante sur <math>[ 0 ; +\infty [</math></li> </ul>
$f : x \mapsto \cos x$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Df = <math>\mathbb{R}</math></li> <li>f est paire</li> <li>f est périodique de période <math>2\pi</math> <math>\cos(x + 2\pi) = \cos x</math></li> <li>La courbe représentative de f est une <b>sinusoïde</b></li> </ul>
$f : x \mapsto \sin x$	<ul style="list-style-type: none"> <li>Df = <math>\mathbb{R}</math></li> <li>f est impaire</li> <li>f est périodique de période <math>2\pi</math> <math>\sin(x + 2\pi) = \sin x</math></li> <li>La courbe représentative de f est une <b>sinusoïde</b></li> </ul>





#### Représentations graphiques



## 5) FONCTIONS ASSOCIEES

Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions définies sur  $D_f$  et  $D_g$ . On note  $C_f$  et  $C_g$  leurs courbes représentatives dans le plan muni d'un repère orthogonal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

Si pour tout réel  $x$  de  $D_g$ , on a :

<p><math>g(x) = f(x - a) + b</math> (où <math>a \in \mathbb{R}</math> et <math>b \in \mathbb{R}</math>)                      , alors :                      la courbe <math>C_g</math> est l'image de la courbe <math>C_f</math> par <b>la translation</b> de vecteur <math>\vec{v} = a\vec{i} + b\vec{j}</math></p> 	<p><math>g(x) = -f(x)</math>, alors :                      a courbe <math>C_g</math> est l'image de la courbe <math>C_f</math> par <b>la réflexion</b> d'axe <math>(Ox)</math></p> 
<p><math>g(x) = f(-x)</math>, alors :                      la courbe <math>C_g</math> est l'image de la courbe <math>C_f</math> par <b>la réflexion</b> d'axe <math>(Oy)</math></p> 	<p><math>g(x) = -f(-x)</math>, alors :                      la courbe <math>C_g</math> est l'image de la courbe <math>C_f</math> par <b>la symétrie</b> de centre <math>O</math>.</p> 

...d'où l'utilité de connaître les courbes représentatives de quelques fonctions de références.

En exercice, on étudiera également les fonctions  $x \mapsto |f(x)|$ ,  $x \mapsto f(|x|)$  et  $x \mapsto af(x)$

## 6) COMPARAISON DE DEUX FONCTIONS

### A) EGALITE

Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions.

On dit que les fonctions  $f$  et  $g$  sont égales, ce que l'on note  $f = g$ , si :

- $D_f = D_g$
- pour tout  $x \in D_f$ ,  $f(x) = g(x)$

**Ex :**

Les fonctions  $f : x \mapsto \sqrt{x^2}$  et  $g : x \mapsto |x|$  sont égales.

En effet  $D_f = D_g = \mathbb{R}$  et pour tout réel  $x$ ,  $f(x) = g(x)$

### B) LA NOTATION $f \leq g$

Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions et  $I$  un intervalle inclus dans  $D_f$  et dans  $D_g$ .


On dit que  $f$  est inférieure à  $g$  sur  $I$ , ce que l'on note  $f \leq g$ , si :

$$\text{pour tout } x \in I, f(x) \leq g(x)$$

On définit de la même manière  $f \geq g$ ,  $f > g$  et  $f < g$ .

**Interprétation graphique :**

La courbe représentative de  $f$  restreinte à  $I$  est au-dessous de la courbe représentative de  $g$  restreinte à  $I$ . (mais pas sur  $\mathbb{R}$ ...)



**Rem :** Soit un intervalle  $I$  inclus dans  $D_f$  :

- Si la fonction  $f$  admet  $M$  comme majorant sur  $I$ , cela signifie que  $f \leq g$ , avec  $g : x \mapsto M$ , et par abus de langage, on note  $f \leq M$  sur  $I$ .
- Si  $f \leq 0$  sur  $I$  (on dit que  $f$  est négative sur  $I$ ), alors la courbe représentative de  $f$  restreinte à  $I$  est située sous l'axe  $(Ox)$ .
- De même si  $f \geq 0$ ...

## 7) OPERATIONS SUR LES FONCTIONS

### A) OPERATIONS ALGEBRIQUES

Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions définies respectivement sur  $D_f$  et  $D_g$ , et  $k$  un réel non nul.

opération	notation	définition	Definie pour :
fonction <b>somme</b> de la fonction $f$ et du réel $k$	$f + k$	$(f + k)(x) = f(x) + k$	$x \in D_f$
fonction <b>produit</b> de la fonction $f$ par le réel $k$	$k f$	$(k f)(x) = k \times f(x)$	$x \in D_f$
fonction <b>somme</b> des fonctions $f$ et $g$	$f + g$	$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$	$x \in D_f \cap D_g$
fonction <b>produit</b> des fonctions $f$ et $g$	$f \cdot g$	$(f \cdot g)(x) = f(x) \times g(x)$	$x \in D_f \cap D_g$
fonction <b>différence</b> de la fonction $f$ et de la fonction $g$	$f - g$	$(f - g)(x) = f(x) - g(x)$	$x \in D_f \cap D_g$
fonction <b>inverse</b> de la fonction $f$	$\frac{1}{f}$	$(\frac{1}{f})(x) = \frac{1}{f(x)}$	$x \in D_f$ et $f(x) \neq 0$
fonction <b>quotient</b> de la fonction $f$ par la fonction $g$	$\frac{f}{g}$	$(\frac{f}{g})(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$	$x \in D_f \cap D_g$ et $g(x) \neq 0$

**Ex :** On considère les fonctions  $f : x \mapsto -x + 1$  définie sur  $\mathbb{R}$  et  $g : x \mapsto \frac{1}{x}$  définie sur  $\mathbb{R}^*$

- $f + g$  est la fonction définie sur  $\mathbb{R}^*$  par  $(f + g)(x) = -x + 1 + \frac{1}{x}$
- $f \times g$  est la fonction définie sur  $\mathbb{R}^*$  par  $(f \times g)(x) = (-x + 1) \times \frac{1}{x} = -1 + \frac{1}{x}$
- $5f$  est la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $(5f)(x) = 5(-x + 1) = -5x + 5$

## B) VARIATIONS (preuves en exercices)

Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions monotones sur un intervalle  $I$  et  $k$  un réel non nul.

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les fonctions <math>f</math> et <math>f + k</math> ont le même sens de variation sur <math>I</math>.</li> </ul>	• $f - g = f + (-g) \dots$
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si <math>k &gt; 0</math>, les fonctions <math>f</math> et <math>f + k</math> ont le même sens de variation sur <math>I</math>.</li> <li>▪ Si <math>k &lt; 0</math>, les fonctions <math>f</math> et <math>f + k</math> ont des sens de variation contraire sur <math>I</math>.</li> </ul>	• Pour $f \cdot g$ , il faut ajouter des hypothèses sur les signes de $f$ et de $g$ pour obtenir des résultats généraux.
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Si <math>f</math> et <math>g</math> sont strictement croissantes sur <math>I</math>, alors <math>f + g</math> est strictement croissante sur <math>I</math>.</li> <li>▪ Si <math>f</math> et <math>g</math> sont strictement décroissantes sur <math>I</math>, alors <math>f + g</math> est strictement décroissante sur <math>I</math>.</li> </ul>	• Pour $\frac{1}{f}$ , nous utiliserons les compositions de fonctions.
	• $\frac{f}{g} = f \times \frac{1}{g} \dots$

## 8) COMPOSITION DE FONCTIONS

### A) DEFINITION

Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions. On appelle **fonction composée de  $f$  par  $g$** , et on note  $g \circ f$  (lire «  $g$  rond  $f$  »), la fonction définie par :

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

L'écriture  $(g \circ f)(x) = g(f(x))$  n'a de sens que si  $x \in D_f$  et  $f(x) \in D_g$ .  
Ainsi dire que  $x \in D_{g \circ f}$  revient à dire que  $x \in D_f$  et  $f(x) \in D_g$ .

**Ex :** On considère les fonctions  $f : x \mapsto x - 1$  définie sur  $\mathbb{R}$  et  $g : x \mapsto \frac{1}{x}$  définie sur  $\mathbb{R}^*$ .

- $g \circ f$  est définie si, et seulement si,  $x \in D_f$  et  $f(x) \in D_g$ , ssi  $x - 1 \neq 0$ .

Ainsi  $D_{g \circ f} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$  et, pour tout  $x \in D_{g \circ f}$  :

$$(g \circ f)(x) = g(x - 1) = \frac{1}{x - 1}$$

- $f \circ g$  est définie si, et seulement si,  $x \in D_g$  et  $g(x) \in D_f$ , ssi  $x \neq 0$ .

Ainsi  $D_{f \circ g} = \mathbb{R}^*$  et, pour tout  $x \in D_{f \circ g}$  :

$$(f \circ g)(x) = f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x} - 1$$

En général  $f \circ g \neq g \circ f$

### B) VARIATIONS

Soit  $f$  et  $g$  deux fonctions, telles que  $f$  soit strictement monotone sur  $I \subset D_f$  et  $g$  soit strictement monotone sur  $J \subset D_g$ , avec pour tout  $x \in I$ ,  $f(x) \in J$ .

- Si  $f$  et  $g$  ont même sens de variation, alors la fonction composée  $g \circ f$  est strictement croissante sur  $I$ .
- Si l'une des fonctions est strictement décroissante et l'autre strictement croissante, alors la fonction composée  $g \circ f$  est strictement décroissante sur  $I$ .

- Ce théorème est surtout intéressant quand les fonctions  $f$  et  $g$  sont strictement monotones sur tout leur ensemble de définition
- Le théorème est aussi valable si on enlève strictement ...

### Preuve partielle :

Supposons que  $f$  et  $g$  soient strictement croissantes respectivement sur  $I$  et sur  $J$ .

Soient  $u$  et  $v$  deux réels de  $I$ , tels que  $u < v$  ;

$f$  est strictement croissante sur  $I$ , donc  $f(u) < f(v)$ .

D'après les hypothèses,  $f(u)$  et  $f(v)$  appartiennent à  $J$ . De plus  $g$  est strictement croissante sur  $J$ , donc :

$$g(f(u)) < g(f(v))$$

Ainsi  $g \circ f$  est strictement croissante sur  $I$ . Pour les autres cas, la preuve est identique ...

**Ex :** Soit la fonction  $h : x \mapsto \frac{1}{3x^2}$  définie sur  $\mathbb{R}^*$ .

« L'expression  $\frac{1}{3x^2}$  peut se schématiser  $x \mapsto 3x^2 \mapsto \frac{1}{3x^2}$  »

Soit  $f : x \mapsto 3x^2$  et  $g : y \mapsto \frac{1}{y}$

Por tout  $x \in \mathbb{R}^*$ , on a :

$$h(x) = \frac{1}{f(x)} = g(f(x)) = (g \circ f)(x)$$

De plus  $D(g \circ f) = Dh$

Ainsi  $h = g \circ f$

▪ La fonction  $f$  est strictement décroissante sur  $] -\infty ; 0 [$ , et l'image de cet intervalle par  $f$  est  $f(] -\infty ; 0 [) = ] 0 ; +\infty [$

De plus  $g$  est strictement décroissante sur  $] 0 ; +\infty [$ .

On en déduit que  $h = g \circ f$  est strictement croissante sur  $] -\infty ; 0 [$ .

▪ La fonction  $f$  est strictement croissante sur  $] 0 ; +\infty [$ , et l'image de cet intervalle par  $f$  est  $f(] 0 ; +\infty [) = ] 0 ; +\infty [$

De plus  $g$  est strictement décroissante sur  $] 0 ; +\infty [$ .

On en déduit que  $h = g \circ f$  est strictement décroissante sur  $] 0 ; +\infty [$ .

**Rem :**

Voilà une méthode assez simple pour déterminer rapidement les variations de la fonction  $\frac{1}{f}$  connaissant celles de la fonction  $f$  ...